


NEDSÆT RISIKOEN FOR AFRIKANSK SVINEPEST I BESÆTNINGER PÅ FRILAND

Svinebesætninger på friland er særligt udsatte i forhold til at blive smittet med afrikansk svinepest og andre sygdomme: Forbipasserende kan smide inficeret mad ind til grisene og smittede dyr kan i nogle tilfælde komme ind på marken. Men nogle gode råd kan nedsætte risikoen betydeligt.



DOBBELT HEGN

Det anbefales at have dobbelt hegn med minimum fem meters mellemrum.


.....



HAV STYR PÅ DIT FODER

Opbevar dit foder forsvarligt og bag lukkede døre eller i beholdere, så andre dyr ikke kan gå i det.

.....



FUGLESIKREDE FODERTRUG

I forbindelse med ekstern smittebeskyttelse er det vigtigt, at fugle ikke kan gå i fodertrugene, da de kan bringe smitte med sig. Derfor anbefales det at bruge fuglesikrede fodertrug.



SKILTNING PÅ PLADS


Det er et lovkrav, at der skal være skiltet med, at grisene ikke må fodres. Det gælder alle udendørsarealer – også løbegårde.

.....

UNDGÅ AT KRYDSE KØRESPOR

Maskiner kan føre smitte med ud på marken via kørespor. Derfor er det vigtigt, at man ikke kører i de samme spor som f.eks. biler fra DAKA eller foderleverandører.


.....



TJEK VASKECERTIFIKATER

Det er vigtigt at transportbiler, som afhenter grise hos dig, er rene. Transportbiler som har været i udlandet, skal udover at være rengjorte og desinficerede også overholde karantæneeregler fastsat af DANISH Transportstandard.

.....



NEDSKYD VILDSVIN

Hvis du som lodsejer ser vildsvin, bør det nedskydes. Observationer skal indberettes til Fødevarestyrelsen via deres app "VildsvineTip"

.....